


ПРОФИЛАКТИКА БРУЦЕЛЛЁЗА

Бруцеллёз - инфекционная болезнь, характеризующаяся длительным течением, поражением нервной и сердечнососудистой систем, а также костносуставного аппарата. Возбудители бруцеллёза — бактерии рода бруцелла — хорошо переносят низкие температуры и замораживание, в воде сохраняются до 5 мес., в почве — 3 мес. и более, в коровьем молоке — до 45 дней, в брынзе — до 60 дней, в масле, сливках, простокваше и свежих сырах — в течение всего периода их пищевой ценности; в замороженном мясе — свыше 5 мес., в засоленных шкурах — 2 мес., в шерсти — до 3—4 мес. При кипячении и пастеризации молока бруцеллы погибают. Дезинфицирующие средства убивают бактерии в течение нескольких минут. В организм человека бруцеллы проникают через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, а также через поврежденную кожу (ссадины, царапины), при контакте с больными животными.



Человек заражается бруцеллёзом при употреблении сырого молока и приготовленных из него молочных продуктов (сыр, масло, творог, брынза), а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Заражение может произойти и при обработке кожи и шерсти животных, при уходе за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.

Инкубационный период (скрытый) продолжается от одной недели до нескольких месяцев, чаще 1—3 недели.

Бруцеллёз характеризуется многообразием клинических симптомов; течение его может быть различной степени тяжести. Заболевание может начаться как

постепенно, так и остро. Острое начало характеризуется повышением температуры, обильным потоотделением, болями в мышцах, поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костносуставного аппарата. Коварство заболевания заключается в том, что больной иногда хорошо переносит жар, сам начинает бесконтрольно принимать жаропонижающие и антибактериальные препараты, вовремя не обращается к врачу. **ПОМНИТЕ! Бруцеллёз лечится длительно.** Стойкие остаточные явления после перенесенного заболевания могут привести к инвалидности.

Комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение заболевания бруцеллезом животных:

- постоянное наблюдение за поголовьем скота и выявление больных животных;
- немедленная изоляция и убой больных животных, который проводят в специальном помещении;
- удаление из стада животных, подозреваемых в заболевании бруцеллезом;
- навоз, кал и последы подозреваемых в заболевании животных необходимо сжечь или глубоко закопать, предварительно засыпав их хлорной известью.
- Обслуживающий персонал должен находиться в защитной одежде и перчатках. Курить и принимать пищу в животноводческих помещениях запрещается.

ЛЮБОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ